

醫林

焦易堂

驚風

驚風者，小兒之病也。其症發時，目睛上視，牙關緊閉，手足抽搐，口吐涎沫，或發熱，或不發熱。此症多由驚風而起，或因感冒風寒，或因受驚，或因食積，或因痰熱。其治法，宜先開其牙關，然後清其熱，化其痰，平其肝。如用藥，宜用蘇合香丸，或牛黃散，或驚風散。如用針灸，宜用人中，或十宣，或合谷，或太衝。此症之治，不可不慎。

醫訊

本報特刊醫訊，以供醫界參考。茲將最近醫界之動態，彙編如下：
(一) 有初病頭痛，發熱，數日後，漸見腹脹，嘔吐，此為傷寒之徵兆。治法宜用解表劑，如麻黃湯，或桂枝湯。
(二) 有初病腹痛，發熱，數日後，漸見腹脹，嘔吐，此為傷食之徵兆。治法宜用消食劑，如保嬰丹，或消食散。
(三) 有初病咳嗽，發熱，數日後，漸見痰多，氣促，此為傷風之徵兆。治法宜用止咳劑，如止咳散，或止咳丸。
(四) 有初病泄瀉，發熱，數日後，漸見腹痛，嘔吐，此為傷寒之徵兆。治法宜用止瀉劑，如止瀉散，或止瀉丸。
(五) 有初病發熱，數日後，漸見口渴，煩躁，此為傷熱之徵兆。治法宜用清熱劑，如清熱散，或清熱丸。

按王孟英醫案

王孟英醫案，乃清代著名醫家之醫案。其治法，多從溫病入手。茲將最近醫案，彙編如下：
(一) 有初病發熱，數日後，漸見口渴，煩躁，此為傷熱之徵兆。治法宜用清熱劑，如清熱散，或清熱丸。
(二) 有初病腹痛，發熱，數日後，漸見腹脹，嘔吐，此為傷食之徵兆。治法宜用消食劑，如保嬰丹，或消食散。
(三) 有初病咳嗽，發熱，數日後，漸見痰多，氣促，此為傷風之徵兆。治法宜用止咳劑，如止咳散，或止咳丸。
(四) 有初病泄瀉，發熱，數日後，漸見腹痛，嘔吐，此為傷寒之徵兆。治法宜用止瀉劑，如止瀉散，或止瀉丸。
(五) 有初病頭痛，發熱，數日後，漸見腹脹，嘔吐，此為傷寒之徵兆。治法宜用解表劑，如麻黃湯，或桂枝湯。

市登記國醫一覽表

徐相任	內科	診所：南京路
鄒晉甫	內科	診所：南京路
姚雲江	內科	診所：南京路
沈仲芳	內科	診所：南京路
許壽彭	內科	診所：南京路
徐小圃	內科	診所：南京路
陳其昌	內科	診所：南京路
馮子鈞	內科	診所：南京路
朱子雲	內科	診所：南京路
方慎金	內科	診所：南京路
朱南山	內科	診所：南京路
蔡香孫	內科	診所：南京路
徐麗洲	內科	診所：南京路
丁濟萬	內科	診所：南京路
殷震賢	內科	診所：南京路
夏理彬	內科	診所：南京路
徐林三	內科	診所：南京路
顧一志	內科	診所：南京路
匡克衡	內科	診所：南京路
陶基章	內科	診所：南京路
威茂祥	內科	診所：南京路

朱星江 內科 診所：南京路
薛文元 內科 診所：南京路
沈心九 內科 診所：南京路
李永聲 內科 診所：南京路
丁仲英 內科 診所：南京路
朱治吉 內科 診所：南京路
劉景山 內科 診所：南京路
胡少堂 內科 診所：南京路
火貴標 內科 診所：南京路
俞同芳 內科 診所：南京路
陳存仁 內科 診所：南京路
沈建侯 內科 診所：南京路
賀芸生 內科 診所：南京路


花露水 洗面可缺



贈券 第三六號




美牌香烟 無不備




內科陸士診例

傷寒	五元
傷風	三元
咳嗽	二元
泄瀉	一元
腹痛	五角
嘔吐	五角
發熱	五角
口渴	五角
煩躁	五角
腹脹	五角
痰多	五角
氣促	五角
牙關	五角
抽搐	五角
口吐	五角
涎沫	五角

金鋼鑽




航空公路 券獎設建




航空公路 券獎設建



梅錫山




紀王養冲




南京訪古雜記




陳光甫返國時一瞥




美製舊材料於我




創底聲聲




南京訪古雜記




創底聲聲




創底聲聲




南京訪古雜記




創底聲聲




創底聲聲



南京訪古雜記



創底聲聲



創底聲聲

